

類證普濟本事方續集

類證普濟本事方卷之四

儀真許學士

○治諸口舌牙齒等患

治上膈熱極口舌生瘡

藏粉

杏仁

亡粒不
去皮尖

右二味臨睡時細嚼令涎出則吐之用溫湯漱口未
全可久食用

又方

膽礬

子一塊

右用百沸湯泡開含漱一夕可瘥八分

又方

五倍子

不拘多少

右爲末糝在口瘡上後用茶清灌漱立止

治口舌生瘡

甘草

五文

白礬

十文

右爲末含化咽喉痛亦治之

治滿口生瘡此因虛壅上攻口舌生瘡

草烏

一个

南星

一个

生姜

一塊

右焙乾爲末每服二錢臨睡時用醋調掩于貼手心

辟心來日便效

治口鼻生瘡

右好生姜一塊臨睡時細嚼含睡不得開口生氣服
著不妨睡覺

治一切牙疼

川升麻

當歸

川乙金

細辛

各等分

葶藶

白芷

荊芥

已上此煎藥三分之二各等分

右七味爲細末用瓦合子貯之緊閉合口每用少許
搽在患牙痛處溫荊芥湯灌漱立效甚者只二次
取牙痛令落不犯手脚

草烏

十五文

畢撥

同

川椒

二十文

細辛

同

右爲細末每用少許指在患牙裏外不過三五次指其牙自落

又方定牙疼

右用三脚牙不拘多少鹽泥固濟火煨通紅出火毒次礪爲末每用些少頻蛀牙孔內立效臨用藥時入乳香末少許令勻同用若先將乳香交和之後恐過即藥性其效較緩是故用臨和勻

治牙疼

雄黃

沒藥

等分

乳香

少許

右爲末若左邊牙疼用藥搗左鼻孔次將藥吹入左

耳右邊牙疼則搗右鼻孔及吹入右耳無不效驗

治牙齒動搖鬚黃赤一服髭烏牙牢妙

生姜

生地黄

一斤各洗令淨研取自然汁滓留取

右不蛀皂角十莖括去黑皮并節將前藥汁蘸皂角
泔火炙令黃用藥汁盡為度并前藥滓同入瓷瓶內
用火煨留性為末牙齒動搖用藥指牙齦上懸黃用
鐵器盛藥末三錢湯調過二日將藥汁蘸鬚臨臥時
用次早已黑三夜三次用之其黑如漆妙甚妙甚此
方乃得自閩知府宅貴宦常用屢有效驗

治牙疼

鶴虱

細辛

白芷

其茄

各等

右件爲末每用少許搯痛處如有蛀孔用飯圓藥末塞入孔中立效

取蛀牙本分法

磁砂

三錢

朱砂

一錢

鵬砂

成塊下錢七

附子尖

十四

信砒

二錢七色黃白有光星者已上各末

川烏尖

七

蟾酥

七個已上同爲末

右和勻五月五日合者佳點藥於牙根上良久用手指搯下次用後傳藥

防風

五文

荊芥

同

乳香

十五文

右爲末搯牙落處并用些子塞牙落孔子此三方余

見一道人貨藥取牙一日常貨三兩貫錢余厚賂之始傳得妙

治蛀牙疼

右川烏大者一箇舊糟內藏箸候一月日透內後出切焙乾入細辛同爲末搯痛處效

又方

川烏

草烏

各一

白附子

半

附子

三七

朱砂

少許
別研

右爲末和勻每服二錢酒水各半盞同煎至七分候冷服臨臥時不得再喫熱物

治一切牙疼風齩熱齩常出鮮血漸至崩落口臭不可

近人者並皆治之

大黃

浸米泔

生地黃

右二味旋切各用一片二片合定貼所患牙上一夜即愈未全可則再如前法再用如說話恐引風要津液清痛處

治牙痛

川烏

阿魏

朱砂

各等分

右將阿魏醋浸入蒸餅搜作團子切片焙乾同三味爲末付牙齦上不可漱口良久或嚥下去亦不妨藥清薰又使其效如神

土駒即三和
大和即特和

治牙疼

土駒

个丁

右一味用舊糟裏定次將紙裏漫火內煨令焦去糟只將土駒爲末付牙疼處立效

治牙崩

信砒

紅丹

右先將砒霜頭在鐵香匙上却以紅丹蓋定文武火上煨令烟盡爲度研爲細末先用枳殼荊芥湯灌漱吐去將前藥末揩牙上不可吞直候涎多吐下又須用前湯灌漱立效

○治諸眼目等患

治諸眼患因熱毒後毒氣攻眼生翳膜遮障服此藥後
遂旋消退不犯針刀

青箱子

防風

枳殼

已上各一兩

茺蔚子

細辛

各半兩

枸杞

澤瀉

生乾地黄

石決明

各一兩半

黃連

半兩

川當歸

二兩

車前子

麥門冬

二兩

右各依法修事焙乾爲末煉蜜圓如梧桐子大每服
三十圓飯飲吞下忌一切毒物

又方治因五臟熱毒壅盛氣攻兩眼赤腫疼痛或生翳

膜白，目羞明，迎風滴泪，並皆治之。

黃芩

大黃

石膏

羌活

各一兩

蛇退

一

右為剉散，每服半兩，朴硝少許，通草二寸，水一大碗，同煎至六分，臨睡溫服，瀉一兩行，不妨。次將溫粥補，自後每服只三錢，重不用朴硝，水煎服，忌熱物及不得啼哭，使怒。

又方

防風

白蒺藜

各一兩

羌活

一兩半

甘菊

三兩

右為細末，每服二錢，鹽少許，百沸湯點，食後服。又方治腎經虛冷，水候不昇，不能上蔭肝木，致令眼目。

昏暗或赤腫痛痒須用此藥方能治

川芎

荊芥

天麻

川烏

烏藥

羌活

黑牽牛

川當歸

金釵石斛

已上各等分

右爲細末煉蜜圓如豆大朱砂爲衣每服一圓薄荷

茶嚙下

治丈夫婦人室女小兒諸般赤眼針頭圓

川烏尖

七個
陳乾

白殭蚕

七個

鵬砂

十文

右爲末用猪膽取汁調藥不令稀用成軟塊攤在枕

內荊芥芥各一兩皂角一莖燒煙將藥枕高覆薰之

常將藥膏攪轉又攤又薰皂角荊芥盡爲度再復

金

雀下

治眼疾穿針散

成塊油單裹定入地中出火毒冬天兩日夜夏天一
日夜春秋一夜取出圓如針頭大每服一圓入眼中妙

木賊

半兩去黑
不要洗者

香附子

細辛

菊花

羌活

各半兩

右為細末每服二錢用好茶少許同點食後服

治青盲雀眼法

右令患人至黃昏時尋雀兒宿處驚令飛起即念咒
咒曰紫公紫公我還汝盲汝還我明如此三日自可
此法雖傳得後不會試尚恐有妄

治眼生翳膜及內外障

烏賊魚骨

一名海螵蛸

生龍腦

許介

右二味碾令極細銅筋點熱湯洗銅筋三五次點立效

又方治眼目赤腫或痒或痛上膈壅熱而成

大黃

苦葶藶

各一兩

右焙乾爲末煉蜜圓如龍眼核大每服一圓至二圓用山梔子仁湯嚥下量大小加減與之

又方解熱眼

大黃

甘艸

當歸

赤芍藥

右爲細末每服二錢湯調下食後服或以一錢末湯洗尤妙

治暑月或行路目昏濇多眵粘者

生竜腦

薄荷

五七葉
手揉爛

右用生絹烈汁滴入眼中妙

治眼洗肝散

此與局方不同銀

大黃

甘艸

黃芩

赤芍藥

甘松

各三錢

乾葛

當歸

熟地黃

山梔子仁

各半兩

右爲細末每服二大錢第二次米泔調

治風痛眼洗肝散

黃芩

甘艸

各半兩炙

菊花

人參

各一兩

玄爲細末每服一錢熟水調下各用忌毒

治久癰壅毒風熱瞽膜并內外障眼

眞宣連

去毛

黃栢

秦皮

右三味等分爲末每服一錢水一盞煎五七沸用灰
絹濾去滓兼熱湯洗候藥冷便住再煖又洗滓又併
煎洗

治氣毒赤腫熱痛眼

好眞連

半兩

生龍腦

自然汁半盞

右二味煎取一盞點洗之飽食後服一呷須用人寶
壯可服虛薄者不可服

洗眼明睛散

馬牙硝

兩丁

青礬

許少

右二味用研勻水調文武火煎乾出火毒一宿次用
蔓荊子防風二味為極細末各三錢重入煎二味同
拌勻每服一字用百沸湯泡洗

治風毒眼癰

何首烏

荊芥

甘艸

各等分

右為細末用砂糖為圓如彈子大每服一圓食後薄

荷茶嚼下

治眼翳赤澁腫疼痛

暴

本事方

類

卷四

治諸眼目等患

木賊

半兩

細辛

半兩

草烏

一兩

龍腦

半兩

右剉每服三大錢水一大盞黑豆半合煎至一兩沸
入沙糖一塊如大彈大煎至八分去滓食後溫服忌
毒煎燖油麪鮑蟹熱物及不得嗔怒房色等事則使
易獲痊安

治赤腫眼

右以白姜末水調貼脚掌心又以土硃蜜調貼眼上
又方治睛疼難忍者

川當歸

防風

細辛

薄荷

各等分

右爲細末每服二錢麥門冬熱水調下食後日午夜

臥各一服

又方

白芷

赤芍

防風

細辛各等分

右為末每服三錢水一盞砂糖二錢同煎七分去滓
溫服不拘時候

治久年眼生黑花不忍者

椒目

一兩炒

蒼朮

二兩炒

右件為末醋糊為圓如梧桐子大每服二十圓醋茶
送下不遇十日取效

點眼水膏

本草方

續

卷四

治諸眼目等症

鵝梨

个

鷹爪黃連

兩半

右用砂瓶一隻先入梨次入黃連末候初冬第一次
下雪時取雪滿鋪入砂瓶內油單封口入地五寸深
候立春日交春時候過了取出點眼或溫溫洗妙

治眼目諸疾點眼膏子

羊膽

个

右一味入蜜一錢在膽內線扎定手其鍋內滿入水煮
熟冷水內浸取出候乾頻入角罐內竹筋點眼四角
立效

袖驗點翳藥照水丹

朱砂兩半

海螵蛸錢一

右二味乳鉢內細碾水飛過澄取又用黃蠟少許溶
入藥待要用時就火旋圓如蘿蔔子大臨睡時用
一圓點入眼角緊合眼睡著次日用溫湯洗下未全
退者更用一服極妙用此藥後或更以所喫藥與之
充妙明醫者自能斟酌但眼患比他疾不同

治男子婦人血灌瞳人及睛疾

生乾地黃

大黃各二兩

朴硝一兩

沒藥兩半

右爲細末每服一錢熱水調下

治倒睫爛弦

蜜

兩

號丹

五錢重

右二味漫火熬成膏入輕粉五文令熱黑色逐時泡

沫點之

點冷泪眼二霜膏

兩鵬砂

錢

蕤仁

十四粒出油

薑霜末

半錢

腦子

許

右乳鉢為細末用糖半兩研勻為膏銅筋點之立效

治諸般眼患菊睛圖

甘菊花

川芎

兩

甘艸

兩

天門冬

兩

右為細末煉蜜為圓如〇大每服十五圓至二十圓

熱水吞下日三服余寓衡陽日有一婦人患眼十年
余與此藥十服瘥

類證普濟本事方卷之四 終

本事方 續

卷四

治諸眼目等患

十二

類證普濟本事方卷之五

續集

儀真許學士述

○治諸喘嗽等患

治遠年日近喘嗽

皂角

不蛀者
三太莖

右一味刮去黑皮刀切開去子每子倉內入巴豆肉
一粒合就麻皮縛定用生姜自然汁和蜜塗令周匝
浸火炙又塗又炙以焦黃爲度劈開去巴豆不用以
好明礬一兩枯過車麻七箇姜汁和蜜塗炙前三味
爲末却以杏仁二兩去皮尖研成膏却與前藥和勻

治十六般哮喘

每服一錢用梯子乾炙過候冷點藥細嚼臨睡服忌
熱毒魚鮓鮐油麪酒米醋煎燂熱毒等物

黃明膠

二兩 炙

馬兜鈴

甘草

半夏

姜汁浸 三日

杏仁

去皮尖已上 各一兩

人參

半兩

右為末每服一大錢水一盞隨病有湯使煎至七分

臨睡食後服湯使于后○心嗽面赤或汗流加于葛

煎服

早晚

○肝嗽眼中泪出入烏梅一个糯米三四

粒煎服

○脾嗽不思飲食或一兩時惡心入生姜三

片煎○胃嗽吐逆吐酸水入蚌粉煎○膽嗽令人臨

肺用藥半錢茶清調下○肺嗽上喘氣急入桑白皮煎○膈嗽咳出痰如圓塊生姜自然汁調藥嚥下○勞嗽入秦朮末同煎○冷嗽天曉嗽甚葱白三寸同煎○血嗽連頻不住當歸末棗子同煎○暴嗽涕唾稠入烏梅生姜煎○產嗽背甲疼痛甘草三寸同煎○氣嗽肚痛脹滿入青皮去白同煎○熱嗽夜甚蜜一匕葱白同煎○哮喘聲如拽鋸入半夏二个同煎○腎嗽時復三兩聲入黃耆白飴糖煎○上件十六般嗽疾依法煎服無不效驗此方乃都下一家專貨此藥活十餘口余因中官厚賂錢物方始傳得屢試

有驗

治遠年日近哮喘妙方

砒錢一

麝錢一

海螵蛸錢一

右三味爲末水調作餅子漫火炙黃再研令細每服一字用井花水調一太呷空心服良久吐出爲度小兒加減與之忌食毒物

治魚哮喘

古老錢个七

白梅肉个七

右水一大盞浸兩宿每服一茶脚許空心服良久吐惡物

治臨上有痰川芎圓

川芎

二兩細剉
漫火熬熟

川大黃

二兩蒸
令極熟

右件焙乾為末用不蛀皂角五七挺溫水揉盡絹濾
去滓瓦器中熬成膏和前二味為圓如棗豆大每服
十五圓生姜湯下小兒三圓

補肺法

地黃

二斤生
淨洗

生姜

四兩

杏仁

二兩

蜜

四兩

右搗如泥瓦合盛飯上蒸五七度每日五更挑三匙
嚥下

治氣喘咳嗽

大黃 半兩

葶藶子 一兩淨洗
瓦上炒

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服五七圓用桑白皮湯下

又方

草烏 五錢
重

麻黃 三錢
重

右為末每服三太錢蘿蔔一個同煮令熟只喫蘿蔔妙

又方

天南星 二個
大者

蚌粉

甘草 等分

右為細末每服一錢水一盞姜三片煎至七分臨臥溫服

治暴嗽

白礬 一兩
細研

砒霜 一錢

砒

右為細末砒霜安放茶盞底却將礬末鋪蓋火煨為末
烏梅肉圓如菜豆大朱砂為衣每服二圓紫蘇湯下
治久年日近喘嗽

蟬退

一兩去頭足

五靈脂

半兩生

批

半兩生用

雄黃

生

杏仁

去皮尖各半兩

輕粉

一兩

淡豆

四十粒

馬兜鈴

一兩生

右件除出輕粉研為末用生薑勑齋自然汁合粉藥
圓如○大每服一圓臨臥細嚼生薑湯送下忌毒

定喘

天南星

半夏

青皮

炒令黃

白礬

炒各等分

右為末每服一錢好北棗去核入藥在內細嚼嚥下

本草方

續

卷五

治諸喘嗽等患

(四)

治諸般嗽

甘艸文十

滑石

葛根

桂枝

花各十文

瓜蒌皮子使

山藥二兩

蚌粉黑色者

苦參各五文

右為末每服二錢姜錢五片棗子三枚水一大盞入蜜同煎至八分服

治勞嗽

青黛錢三

辰砂分丁

雌黃

雄黃

白礬

信砒各一錢並生用

右並為末淡豆豉一百粒湯浸去殼研如膏入前六味圓如梧桐子大每服一丸臨睡冷茶清下

化痰涎方

明礬

一兩 枯過

白殭蚕

半兩 去頭 煎

古為末研生薄荷令爛和圓如棗豆大每服二十圓

薄荷湯下日三服

治嗽

不蛀皂角

去黑皮

乾姜

板桂

去龜皮 各半斤

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服十五圓姜湯臨睡

時下

治諸般嗽疾

天南星

半夏

各一兩 各使姜汁浸一宿

猪芽皂角

去黑皮 並子

杏仁

去皮尖
麪炒黃

青黛

各半
兩

燄硝

錢

巴豆

二十一粒
去殼生用

右一處為末姜糊圓如菉豆大每服七圓臨臥姜湯下

○治諸療癰等

治諸療癰

朱砂

砒霜

硃砂

馬牙硝

各等分

右乳鉢內研細麪糊搜如香附子狀相瘡口大小作之儘送入瘡口中若腫時用蒲荷研細塗之盛收口子却將大栢皮并白丁香並為末盡入孔中如邊不乾却用

江子

乃巴豆也去殼不拘多少

右用麻油煎令赤火氣後去巴豆入蠟合如膏看瘡口大小塗之及將白芨末水調塗瘡上立效

又方

蜜陀僧

文十

青礬

文五

右二味爲末乾糝更用麪糊搜藥作奄貼之候瘡乾更上藥三五次然後用白芨黃柏皮二味水調作奄貼之無不效者

治鼠癰癰瘰

刺猓皮

文上

右一味研爲末入水銀粉乾傳

膏

又方

田螺殼

燒灰
留性

右一味為末傳之妙

又方

黃荊子

又名蔓荊子

乳香

甘草

各等分

右為末每服一錢熱湯調食後良久服

又方

土附子

一個洗

鹽

小便

五升

取三味同浸半月日取出將附子去黑皮陰乾為末用黑豆爛煮研為膏圓附子末如梧桐子大每服七

國溫酒早晚下二服

治漏瘻

蛇菰子

不拘多少

右一味瓦上燥乾為末用帛撚搽入瘻內立效

○治諸鼻耳等患

取鼻痔

巴豆

十二个去殼

陽起石

一斤

石蓮肉

三十个

右為末每用半字許搽入鼻內入用綿塊子蘸藥塞入鼻中其痔內化爛出了

又方

蝸稍錢一

巴豆五粒去油

丁香五粒

白丁香七粒

右為細末用螺青一字和勻用內消膏藥添開入上件藥搜圓如龍眼核大用一圓安鼻內

又方

苦丁香乃菰蒂十四個

赤小豆

丁香各十個

右漫火焙乾為末入腦子少許口內先食水次將小竹管吹藥入鼻中半盞茶末多入盡為度候頭疼時取下

消鼻痔方

瓜蒂四錢炒

甘遂同

白礬半錢枯過

螺青

半錢炒

草烏尖

炒同

右爲末用真麻油搜令硬得些子不可爛旋圓如鼻孔大用藥入鼻內令達痔肉上其痔化爲水肉皆爛下每日一次用妙不可言

治耳聾

鼠膽

二小

右一味滴入耳中三次便立效

又方

海螵蛸

右一味爲末吹入耳中數日瘥

本事方

續

卷五

治諸耳聾

治耳出膿水不止俗呼油耳

白礬

燒灰

右一味爲末吹入耳中日三次立效

治諸虫及風等入耳

白膠香

右一味燒煙薰耳中令知耳孔內煖蟲自出妙

治蜈蚣入耳

半夏

生

右一味爲末麻油調塗耳門外蟲聞香自出

治飛蟲入耳

右用好酸米醋一盞滴入耳內蟲必出不出即死
有一人被焦虫入耳其虫口硬如鐵但身軟用此藥
滴之立死而出

治酒查鼻及婦人鼻上生黑刺者

生硫黃

文十

輕粉

同

杏仁

文五

右爲末用餅藥調臨臥時塗早則洗去

治鼻不聞香臭多年者亦治

生葱一味

右將葱分作三段早用葱白午用葱管中截晚換葱
管末梢一截塞入鼻中今透裏方得不二三日用之

便聞香

類證普濟本事方卷之五

終

類證普濟本事方卷之六

續集

儀真許學士述

○治諸癰癤等患

化毒方治一切癰疽瘡癤未成者速散已成者速潰敗膿自出無假手擠惡肉自去不犯針刀服藥後疼痛頓減此其常用者效也此方得自於都下異人時有背背瘍者七十餘頭諸藥試遍不獲痊效衆醫環立如堵出是方示之相目而笑曰是豈癰背所用藥耶因謂之曰古人用方自有意儀觀其所用藥性平和縱未能已疾必不能壞病服之何害廼治此方藥與之以熟酒下外

挖花

膿

補
恐
項

本事方

卷六

許下藥五六錢少頃頃減七分數服後瘡大潰膿血流
逆若有物自內挖出服之半月瘡口遂合若未常有所
苦者又有苦腹疾者其痛異常醫者莫曉時意謂此藥
大能止痛試與餌之當日下瀉二三碗許痛亦遂止思
察之乃腸瘻也又一老人忽胸間發腫根脚甚大毒氣
止收如一瓢然斜插頂右不能轉動遂以此藥與服明
日腫毒既散餘一小瘤如粟米大又明日怙然如故無
事又一人發腦疑此藥不能救遂殞於庸醫手次年其
子復苦此疾與父無異病狀一同因懲父之失縱飲酒
服此藥而至不覺太醉竟日寐臥地上及至酒醒病已

去矣又一婦人發乳癰腫疼痛日夜叫囀不絕哀苦之音皆不忍聞自謂無復生理又有一婦人股間發腫大如杯碗服此藥皆脫然如失物是藥濟苦者不可記數姑據一二以示大略大抵癰疽之作無非氣血凝滯風毒壅結或飲酒食熱物過多房室虛甚榮衛不調所致治之不早則外壞肌肉內攻臟腑去生遠矣詳味此方其所用藥皆發散風毒調理氣血排膿止痛生肌長肉等藥五毒不試而坐收瘍醫十全之功其可悉述乎

人參

用新羅者割結重火蒸潤
者洗淨去芦薄切焙乾

防風

舊新者淨洗切焙

當歸

取川中來者澤大今如馬尾狀滋潤
脾辣者香芳者溫水洗薄切焙乾

黃耆

川綿者為良狀黃耆者長一二尺不開者洗淨寸截碎如絲狀以鹽湯浸透微火炙

酥再到入

衆藥中

芍藥

川中者為上今多止是

厚朴

宜用梓州來者厚而紫者去油色佳去麋皮切姜汁淹一兩焙炒

白芷

桔梗

以有心味苦者為真無心味苦者有薄皮也切勿誤用洗淨去頭薄切焙乾

桂

宜用卷薄者古法帶皮桂每兩止取二錢半用一兩者當買四兩內取一兩好者不見火

甘草

生

右十味選藥貴精者皆取淨曬乾極燥方秤人參當歸黃耆各二兩其他七味各一兩除桂外一處為末入桂令勻每服三錢漸加至五六錢熱酒調日數服以多為妙服至瘡口合更服為佳所以補前損杜後

患也不飲酒濃煎木香湯下然不若酒力之勝也或飲酒不多能勉強間用酒調下并木香湯解酒切效當不減於酒也

又方治一切惡核癰瘰癧疽等病及惡腫

青木香

沉香

乳香

麝香

升麻

獨活

連翹

桑寄生

木通

夜干

己上一分

大黃

右咬咀

乃為剉散也劉令如麻豆大也

每服四錢水二盞煎至一盞

已上去滓取八分清汁空心熱服半日已上未利再服以快為度或下惡物未生肉已前時服不妨以析

毒熱之氣或有人使竹瀝芒硝忍用藥之人不能堪
量是故不載外者當自相度用之

又方治癰疽發背丹痧赤腫惡肉時行熱毒變作赤雜
及眼赤痛生障翳病方

黃芩

白芨

麻黃

去節

漏蘆

真者

白薇

枳殼

熟炒去穢

升麻

白芍藥

川當歸

川牛膝

甘草

各二兩

右為麁末每服四錢水一盞半煎至七分空心熱服
或利一二行如未利再服可加芒硝三錢未成者散
去已成者立潰癰癰藥中無如此三方妙絕余每用

濟人不少，凡有患瘡癰發背等疾，服此二三藥，復安之後，宜常服四物湯，交和黃耆建中湯，空心煎服，禦未來恐疾再作，傳其難又兼費財不秘者。

治發背內潰及諸惡毒衝心嘔吐疼痛不可忍，三兩服可救一命，應干瘡毒癰疽等疾，每日一服，無不除愈，內托毒氣，使出及外不至內攻，乳香散。

菜豆粉

四兩

乳香

一兩

右二物再同碾極細，每服一錢，新汲水調下水，不宜多要藥，停在胸膈也甚妙。

○治諸水腫氣疾

治十腫水病并根源証狀方法

一蒸水先從左右肋腫根在肝藥是大戟

二赤水從舌根起根在心葶藶子

三黃水從腹腫起根在脾甘遂

四白水從脚起根在肺藁本

五黑水從陰

外腎也

腫起根在腎連翹

六玄水從面腫起根在外腎羌花

七風水從四肢腫起根在腎澤瀉

八石水從腎腫起根在膀胱桑根白皮

九蒿水從滿腹腫起根在小腸巴豆

十氣水或成或裏根在腹赤小豆

右十般腫病各有根源種種不同看十腫病根除一
味用將九味等分逐味用製者依法修治焙爲細末
煉蜜爲圓用赤茯苓湯吞下不拘時候其圓如梧桐
子大每日三服忌鹽一百二十日綠鹽能化水故也
然忌魚鮮麪食一切毒物及生冷等物及不得行房
事此病去生甚速取死將近或得良醫醫者得余此
方慎勿輕賤雖千金難換但余欲天下人安故也用
此方獲瘥之後更用後來補藥

補藥方

肉桂

去麤皮

青皮

去白

乾薑

洗湯

我朮

醋煮軟

川芎

肉豆蔻

雞心橫柳

桔梗

各等分依法煮

右等分事治為末每服三錢百沸湯點服空心食前

日午食前晚食前各一服○前頃二方治水腫病余

見鄉人有患水疾半年後得名醫獲瘥余遂百計求

此醫人多酬黃白之物遂得此二方余試用之百發

百中獲濟者無數世間所有水病方藥無此二方之

右者余初出本事方前集尚有此後集二帙初深秘

之今見前集已盛行于世此後集今亦略傳一二仁

者使天下皆得躋盡天年毋罹枉斃云

治婦人經脉不通即化黃水水流四肢則遍身皆腫名曰血分其候與水腫相類一等庸醫不問源流便作水疾治之非唯無效又恐喪命此乃醫殺之也宜用此方立效

人參

川當歸

瞿麥穗

大黃

濕紙裹二年米上蒸米熟去紙焙干

赤芍藥

桂枝

去皮

白茯苓

已上各半兩

苦亭陸

炒二分

右爲細末煉蜜圓如梧桐子大每服十五圓空心米飲下漸加二十圓止於三十圓每無不效者

○治諸瀉痢疾

附太便秘

治冷熱痢疾

驚栗殼

二兩

白薑

三錢重

洋艸

五錢重

芥葉

半兩

右件咬咀分作三服每服入蜜十文用水一盞煎至七分溫服空心下

治一切痢

砒霜

黃丹

各等分

右同研細用黃蠟溶和藥末為膏旋圓如菰豆大每服三圓飯飲下小兒圓如粟米大飯飲下忌葷腥

治赤白痢

赤芍藥

香附子

炒去毛

地榆

等分

右三處為末留心認記赤痢用赤芍藥末一錢香附

子末半錢地榆末例用一錢蜜一七水一盞煎五七沸空心溫服白痢香附子末一錢芍藥半錢地榆一錢蜜一七水一盞同煮至七分空心溫服日二服小兒加減與之

治脾胃有積臟腑不寧冷熱相搏遂成赤白痢疾不思飲食腹痛下可忍並皆治之

聖藥散

四兩

川當歸

半兩

甘草

炙

白芍藥

桂

去皮

訶子

白善土

煨各半兩

右為細末每服五錢沸湯點服空心服或用生薑二片棗子二枚同煎至七分空心服尤妙

又方

茱萸

黃連

阿膠

白芍藥

等分同炒
今焦黃色

右為細末麪糊為圓如梧桐子大每服三十圓陳米飲下小兒十圓

又方

黑豆

五十粒

陳皮

半兩

罌粟殼

十四個

甘艸

三寸

右四味半生半炒用水一椀藥散四錢煎至七分空心溫服盡此一劑無不效者

治瀉痢

白石脂

乾薑

等分

右爲末麪糊爲圓如梧桐子大每服三十圓飯飲空心送下霍亂吐瀉漿水下

治水瀉并赤白痢

草烏

大者一兩半

右將一半燒灰一半生用爲末醋糊爲圓痢莖三大每服七圓赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下水瀉并化水下並空心服忌腥臊

治大便秘結

大黑腰棗

三個

右將棗子擘開去核水銀粉於棗核孔中塞滿濕紙

肺多作腸

裏煨用生葱茶清嚙下

治大人婦人膈上虛熱肺腑痰壅調三焦開胃口大小便秘結不通及腸風等疾並皆治之

麻仁八錢

右為末除出麻仁研為膏次入前藥煉蜜為圓如梧桐子大每服二十圓空心茶酒任下

治大便秘結搜風寬腸

青皮去白

威靈仙去頭洗各二兩

大黃丁酉半

大戟一兩

牛蒡子四兩新瓦上炒

右為末每服一錢人實壯每服三錢蜜酒調下服畢

漱口

治肺臟風毒熱壅鼻塞口乾大便秘

枳殼

一兩欸
炒去穢

川朴硝

一兩

川大黃

同

牛蒡子

半兩
炒

芫薺

二分

郁李仁

一兩半
去皮

右爲末每服一大錢蜜水調下忌一切熱物等物

治大小便不通行滯氣五宣散

瞿麥

木通

甘艸

虎杖

滑石

各等分

右咬咀每服二大錢水一盞燈心數莖煎至七分時
臥時溫服

治大小便秘經日欲死者

推車

七

土狗

同

○如男子病推車客用頭土狗用身
如女人病土狗用頭推車客用身

右新瓦上焙乾爲末只一服用虎目樹皮向南者濃
煎汁調服經驗如神

治赤白痢

罌粟湯

一貼局
中者

加白朮

半

右將白朮分作二分罌粟湯全貼只作一服煎入白
朮一半服畢再將滓加白朮一半甘草三寸木瓜三
枚同煎又服立效

極妙痢藥

石榴皮

陳皮

甘草

川當歸

罌粟

各半
兩

右將上件五味咬咀用水十盞煎取三盞次用下藥

茯苓

七錢重

粉草

同

北棗子

七

右為末將煎藥汁入此三味再煎五七沸去滓空心溫服甚者不過兩劑小可劑則一劑效

治痢妙應圓

黃丹

三錢重

巴豆

四十九粒去油

右二味研為末黃蠟溶開入藥調勻候冷取出安瓦合子盛要用時旋圓如棗豆大每服四五圓赤痢其
 料湯下白痢乾姜湯下赤白痢相雜乾姜并料同煎
 湯下可加烏梅同煎水瀉米湯下瘧疾桃葉七片揉

水面北五更初下發日服

救命延年治丈夫婦人一切重痢

黃連

六兩

乾薑

當歸

阿膠

各三兩

右三件為末用米醋煮阿膠令消盡須用別料得醋恰好不可剩將藥末搜醋圓如梧桐子大每服三十圓飯飲吞下甚妙如神痢方中之魁也

治痢疾

黃連

巴豆

去殼各三兩

右二味和炒赤色各研為末以菜豆打糊為圓如○大作記認二處安頓巴豆末作一處黃連末別作一處白痢黃連圓

二十粒米湯米泔下赤痢巴豆二十粒用井花水下
治婦人胎前產後赤白痢

生薑

年少者百錢重年老者二百錢重時自然汁

鴨子

一隻打碎入薑汁內搗勻

右二味煎至八分入蒲黃

三錢重

煎五七沸溫湯空心

服立效

此二方授于和州章道人

類證普濟本事方卷之六 終

類證普濟本事方卷之七

續集

儀真許學士述

○治諸痔疾

并論五痔

大凡五痔皆因虛憊恣食五辛五味鷄魚而成熟毒壅入大腸津液不通氣血凝滯久坐久忍不糞太冷入河水洗酒後行房及暑月行路坐諸熱地又移坐冷種種能成斯病

一者肛腸生肉腎痔鼠竅或似櫻桃或大豆時時出血又如出膿名曰鼠竅痔

二者肛邊大乳痛腫無膿血名酒痔飲酒便發

三者肛邊努校疼痛難忍糞則有血或因憂愁思慮
冷熱不調無時而發名曰氣痔或大便澁難氣結不
通下血面黃食少無味名曰口痔

四者大便後下諸膿血更加痛澁肛腸努出名曰脫
口痔

五者氣攻兩腎脬大便不通糞血色下赤黑毒熱不
消肛門濕痒一似虫行名曰風熱內痔

五痔者因房室太勞多食雞魚陳久之物卽成斯疾也
熏洗痔方

枳殼 不拘
多少

右爲末每服二錢水一盞枕砂瓶內煎百沸先去瓶上坐熏後却瀉出通手熱洗妙

治痔下腫痛

枳殼

一兩陳粟同炒
令黃赤米不用

青木香分

右爲末每服二錢飯飲調下

治痔漏瘡方

雞子

一隻煮熟去
黃取白切焙

白礬

明者如皂角子大
足上作過用三兩

右爲末先用溫湯淨拭乾用紙撚點藥送入瘡孔內

立效一日三易

治痔方

信砒一兩煨 穀精草三錢 白礬一兩 礪砂三錢

右為細末綿塊點藥撲上如痔乾可用調傳

治因痔疾阻碍大便秘結

牽牛 青皮 威靈仙 大戟 大黃

右為末量人大小每服一錢二錢至三錢用蜜酒調

下須用冷熟水漱口

治男子婦人諸般痔漏

黃牛角 狼毒等分

右為末糞花漏每服一錢并艸湯下合官漏酸醋調

一錢滴珠漏山梔子三箇煎湯下半錢榮漏姜湯調

下半錢腸風米飲下一錢

治痔

神香

明者多灰多燒則有灰

右一味燒苦竹瀝調傳

治諸痔痛

大蜈蚣

一條

大青州棗

三個

白礬

一塊如大

右將蜈蚣白礬二味為末用棗肉圓分作二圓燒煙

用竹筒透引煙熏痔妙

治腸風痔漏

赤芍藥

官桂

甘州

炙已上等分

右咬咀每服二錢生薑二片白礬一塊水一盞同煎至七分去滓空心服

又方

雞冠花

不拘多少

右一味濃煎湯每服一盞空心下

治痔漏此因大腸感風熱而生

生砒

字一

水銀

一粒半米大

膩粉

字一

眞麝

一粒半小豆大

右件並入乳鉢內研令極細如痔或有珠者將白礬湯淨洗拭乾用手擦藥指在痔肉上指得痒時便是藥行一日二次用又洗去五日後住藥見效如或

有孔即用紙撚子引藥送入令徹其內更用紙塞孔
前一日兩次使藥自能生合

治風痔漏不問有頭差差頭定三日安

藥蘭

燒灰
半兩

白角針

只用針不用
皮條炒二錢

天麻

半兩

乾薑

同

蓮子艸

一兩

眞麝

半錢

橘子硫黃

一兩

明礬

同

苦瓜萆

一介
大者

右將瓜萆開一孔如小錢大入礬并硫黃在內却將
元掩合定藤紙糊却瓦罐子盛生新上炭火煨令煙
盡爲度瓶內閉死候冷取出研細同前六味藥末和
令勻煉蜜圓如梧桐子大每服十圓至十五圓空心

溫酒下日三服三日見效忌油麪醃藏牛馬肉魚腥
生冷行房行遠勞力一切忌之

聖方痔藥

白礬

血愈

石竹

各半兩

胡椒

二十粒

右用瓦罐盛泥固濟猛火煨通紅取出去泥用藥細
研爲末五更時用不語津調付痔頭上不過三服效
治肉痔太腸頭痛

仙茆

白朮

石卷栢

各一兩

郁李仁

三錢

右件爲末每服一錢薄荷酒下

治痔方

白礬

乳香 各一兩

泥礬 少許

右爲末用好醋二升熬成膏痔上點之效

治痔頭疼痛有瘡膿水不止方

朱砂

三錢

砒

半錢

麝

好者二分

巴豆

一粒去油

安息香

一分

阿魏

一分麝裏煨熟

右爲末蒸餅爲圓如菉豆大每服空心枳殼湯下一

圓不過十日取效

理痔方

五靈脂

四錢

膩粉

半兩

麝香

三十分

右研爲末先用甘草湯洗後用津唾調抹痔上痔濕

則乾撲

熏痔方

官桂錢五

蛇床子兩半

蛇退條一

右為末每用一錢湯煎熏洗

傳痔方

斑猫个十

輕粉錢半

馬牙消三十文

好紅椒錢一

黃皮錢半

右為末先用皂角荆芥洗令淨拭乾用麻油調藥傳

收痔方

白欬

白芨各一兩

黃皮二兩

右爲末入輕粉麝香各少許麻油調傳立收了此藥不能去根但緩急展限而已

治腸風痔漏

鯽魚一個

右將魚破開去盡腸入白礬令滿瓦上燒過並爲細末用鷄毛捲藥傳之立效

治腸風痔漏

大黃

當歸者

苦參

牙皂

去皮

右等分爲末醋糊圓如梧桐子大每服二十圓空心溫酒下

治痔疾腸風

半夏

湯泡洗七次

黃芪

枳殼

去穢

右爲細末姜汁糊圓如〇此大每服三十圓溫酒空心下

治痔漏下血不止及收痔

城市河中水

右一桶水脫衣坐水中頻洗即止痔亦可不過三五次立效

治諸痔疾

塗杉

朴梢

大黃

側柏

各等分

右咬咀瓦罐內煎二十沸安身於罐上坐熏其痔疾
堪手下則洗之效

又方

枳殼

甘草

香附子炒去毛

右各等分爲細末每服二錢米泔調下甚妙此方乃
吳知府宅方

治痔漏

穿山甲

一兩火
熬焦煙

麝香一錢

右爲末每服一錢空心飯湯下

熏痔方

本事方

卷七

治諸痔

鼠即皮

按：乃蛇鼠

右丁味瓶內燒煙坐身於瓶口熏三五次除根
又方

右用降真香燒煙熏妙

類證普濟本事方卷之七終

類證普濟本事方卷之八

續集

儀真許學士

○治諸打撲傷損等疾

治打撲傷損

川烏

草烏 各一兩

右為末用生姜汁調作搗子貼損處又綿縛定

治打損接骨方

接骨木

半兩乃蒲葦是

好乳香

半錢

赤芍藥

川當歸

川芎

自然銅

各一兩

右件為末用黃蠟四兩溶入煎藥末攪勻候溫軟衆

按不同傳書
本經云下
草上此乃下
類集

手圓如大龍眼如打傷筋骨及閃拈著疼痛不甚急者用藥一圓好舊無灰熱酒一盞浸藥候藥漬大開兼熱呷之痛絕便止若大段傷損碎折先塗了骨用前藥貼了然後服此藥表裡兩次無不效者此二方是一副不可分開余得之費數十緡今不敢秘

治打撲傷損

草烏 五兩

沒藥 三錢

自然銅 半兩

青皮 二兩

苦丁香 十個 研

右為末每服二錢用溫無灰酒調喫黑水牛肉蘿蔔只得使鹽此二物之外並皆忌之不得喫

治打撲傷損定痛掩

木瓜

木

蜜陀僧等分

右爲末入麪少許調作糊貼痛處

又方

草烏

白蘆蠶

蒼朮各等分

右爲末姜汁調貼痛處

治打撲肉損筋骨疼痛

沒藥

乳香

芍藥

川椒去子及同

川芎

當歸

各半

自然鈿

錢半炭火燒

石爲細末用黃蠟二兩溶開入藥末不住手攪令溫

圓如彈子，大每服一圓，用好酒煎開，消盡，乘熱一服，喫盡，看那處痛，向痛處臥，霎時服三五圓，立效。
治打撲傷損

生葛根

右一味搗爛，用米醋調開，攤痛處，綿縛定。

又方

右野柳樹根細杵，用米醋調開，攤痛處，古井橘葉白酒糟杵細縛痛處，或太疲痛，用火燒令紅，用醋拌米泔潑地上，急鋪薦，患人去薦上臥，蒸出汗。○內則服藥，外則貼掩，則易安。

治打撲傷損筋骨

右夜合樹皮四兩炒乾末之入麝香乳香各一錢重
每服三大錢溫酒調不飢不飽時服

治刀箭傷血出不止并骨折

橫柳个

木香

胡黃連

各三錢重

右爲末傅瘡口上血止又接得骨

治筋骨諸疾手足不遂行動不得遍身風瘡左經圖

草烏

白者去皮屑

木鱉子

白膠香

五靈脂

各三兩半

川當歸

斑蝥

百个去刺足點

右爲末用黑豆去皮生杵取粉一斤醋糊共搜和爲

面如雞頭大每服一圓溫酒磨下筋骨疾但未曾針
傷灸損者三五服立效此藥曾醫一人軟風不能行
不十日立效專治心腎肝三經通小便除淋瀝通榮
衛滑經絡此方傳自淨因寺聖僧處得之大有奇效
治打撲傷損腫痛傷風

天南星

半夏

地龍各等分

右爲末用生薑薄荷汁調貼痛處

○治諸寒瘡等疾

治脾胃有積久不尅化或元有此證遂成寒瘡之疾或
先寒後熱或先熱後寒或但熱不寒或但寒不熱或痰

謹語除傷寒之外是瘧疾者皆治之

人參

木香

官桂

白朮

茯苓

黃連

附子

柴胡

黃芩

厚朴

甘草

麻黃

各三錢重

肉豆蔻

十個

檳榔

五個

右咬咀每服三大錢水一盞生姜三片烏梅一個同

煎至七分入酒少許又煎三五沸溫服此藥兼治虛

弱之人

又方

白薑

良薑

半炒半生各半兩

右爲末每服二錢猪腎酒調下

治久患勞瘵

柴胡

恒山

各一兩

秦艽

甘草

各半兩

右咬咀每服五六錢酒水各一小盞童子小便半盞同煎至五分當發白五更初面北服

治久瘵久痞

川烏

大者二個生去皮臍

右爲末每服一大錢水一椀棗七個煎至七分五更時冷服

又方

粉霜

朱砂

各二錢重

萊豆粉

七錢

右件爲末糊爲圓如○此大每服一圓冷水五更初

下忌生冷物

微瘡丹

螺青

硫黃

官桂

白礬

巴豆

去油各等分

右件藥取五月五日爲末面南用絲子角爲圓如梧

桐子大每服一圓用新綿裹男左女右耳內安發日

用之

又方

良薑

白薑各等分

石二味火上煨留性為末每服三錢雞猪膽一个水
一盞溫酒調下立效

治寒癰勞瘵方

鼈甲

不拘多少

右一味醋炙令黃為末每服二錢溫酒調下空心食
前及臨臥時各一服

治癰疾方

大蒜

一頭分四片

右每一片內入巴豆肉一粒濕紙裹煨熟去巴豆研

入黃丹爲圓如鷄頭大每服一圓先發寒用桃枝七寸東向者煎湯發日五更向北服如先發熱用冷水送下未全安次發又可進一服即除根

類證普濟本事方卷八

終

類證普濟本事方卷之九

續集

儀真許學士述

○治諸腸風酒痢等疾

治腸風瀉血

牽牛

五兩

牙皂

三兩不
然者

右二味水浸三日，後除皂角，將酒一斗，煮令乾，焙爲末，煉蜜圓，如此。○大每服七圓，空心溫酒下，空心日午夜臥各一服，或轉下黃物不妨，病可，後常每日服五圓飯飲送下。

又方

皂角樹上蕁

石新瓦上焙乾爲末每服一錢溫酒下

治丈夫瀉血婦人血崩漬入大腸出血

豆蔻

檳榔

各炒
紫色

罌粟殼

燒灰

右三味等分不拘多少爲末每服二錢飯飲調下空
心服

治腸風下血

核桃殼

蒲退

皮鞋底

赤雞冠花

各等分

右四味燒灰爲末每服一錢溫酒調空心下

治腸風

小赤豆升

右一味瓦上炒令黑色爲末每服三錢粥飲調下日
三服各飯前服

又方

瓜蒌三
个

右一味燒灰留性爲末每服三錢米湯調空心下

又方

蕨菜花

右不以多少文武火焙乾爲末每服三錢飯飲下

又方

金星草

三兩

陳干薑

同

右爲細末每服一錢新汲水調下空心

治腸風

綿瓜

不拘多少一名變瓜一名天羅
又名天絲瓜其實皆綿瓜也

右一味燒灰存性酒調二錢空心下

治腸風并脫肛及有血

蛇床子

不拘多少

右一味炒爲末去大腸脫垂處貼立收妙甚

治腸風及脫肛不收有血下

不蛙皂角

五枚

右一味搥碎水一碗揉令皂角消盡絹二重漚過取十分清汁將脫肛腸浸在藥水中其腸自收不用手蕩如大收了更用湯盪其腰脫上下令皂角氣行則不再作三次盪

治腸風

五倍子

白礬

各半兩

右爲末順流水圓手如梧桐子每服七圓空心飯飲下忌酒

治腸風臟毒丈夫婦人皆治

大蒜

二頭紙裹煨熟研成膏

右爲圓每服二十圓米飲送下空心

治腸風臙毒酒痢下血

黃連

生姜

右二味煎湯下二氣再次服五塊圓圓方于後

五塊圓

五倍子

槐花

塵者

白藥

好者谷等分

右焙乾爲末酒糊爲圓如此○大每服二十圓空心
米湯下日三服

又方

川當歸

枳殼

側柏葉

塵槐子

芍藥

百草霜

右剉同一處炒令煙微起末之每服二錢空心溫酒調下日午米湯調下各飯前服甚妙

○治諸寸白虫等患

取寸白虫

錫灰

才鼈

各一兩

蘆薈

二十文

黃丹

輕粉

各十文

右爲末猪膏油圓如○大先齋一日晚莫喫飯次早五更溫水吞下分作二服

又方

錫灰文十

右為細末用棗肉為圓如梧桐子大只作一服先齋
一日次日五更喫燒炙淡猪肉一枚次用溫水送下

又方

右生芥葉細杵井花水解取汁一盞五更初先喫炙
猪肉一片次服芥汁已時下了

取寸白虫

蕪荑文十

雞心檳榔二

柳芽草半

雷丸文三

輕粉計少

右為末每服二大錢四更時茶清調下隔夜點取茶

四更時取清

搗取寸白虫方

巴豆

七粒去殼出油

皂角

去皮取末一錢

右用京墨磨醋糊為圓如此○大只作二服五更初
橘皮湯下

取寸白虫方

苦綿瓜子

不以多少

右研為末每服二錢好酒半盞空心調服

取寸白虫方

畫粉

蜜陀僧

各等分

右爲末每服二錢用麻油調服空心下頃刻成涎取
下

又方

定粉

右細研每服一錢生麻油調五更服晚取下

○治婦人諸疾

治婦人血脉不調往來寒熱狀似勞倦

川當歸

川芎

甘艸

黃耆

桂

各去粗皮
一兩

熟地黃

半丁兩

白朮

半兩

白芍藥

二兩

柴胡

半兩

阿膠

半兩

右爲細末每服五錢棗子一枚水一盞半煎一盞空
心溫服白湯點服亦得常服不生帶下調血脈養子
宮終身無病

治婦人衝任虛損月候不勻或來多不斷時復淋瀝或
過月不來或房中去血過多又治損娠小腹急痛發熱
下痢手心煩熱又治久無子息並宜服之

吳茱萸

三兩去目者
以湯洗淨三次

川當歸

半夏

各二兩
半製

麥門冬

去心
五兩

芍藥

人參

芍藥

牡丹皮

桂皮去粗

阿膠炒

甘草

炙各
二兩

右爲剉散每服三錢水一盞半生姜五片煎至八分

去浮熱服空心食前

治婦人赤白帶下

龍骨

半兩

舶上硫黃

三錢

右為末每服半錢無灰酒調空心服下日三服不
問遠年日近盡令痊愈

類證普濟本事方卷之九終

類證普濟本事方卷之十

儀真許學士述

類集

○治小兒諸疾

治小兒十種丹瘤腫毒所起形候并方法

一飛竈丹從頂頭起腫光

用葱白研取自然汁塗

二吉竈丹從頭上紅腫痛

用赤小豆末雞子清調塗

三鬼大丹從面起赤腫

用竈心土雞子清調塗

四、天火丹從背起赤黑

用桑白皮末羊脂調塗

五、天竈丹從兩臂赤腫黃色

用柳木燒灰水調塗

六、水丹從兩脇腫

用生鐵爲末猪糞調塗

七、胡次丹從臍上起黃腫

用檳榔爲末醋調塗

八、野火丹從兩脚赤腫

用乳香末羊脂調塗

九煙火丹從兩脚有赤白點

用猪槽下土麻油調塗

十胡漏丹從陰上起黃腫

用屋漏庭土羊脂調塗

右此十種丹毒變易非輕治之或緩能終不救余不
惜此方能逐一仔細辨認依此方法治之萬不失一
神經三日又愈病入臟腑則終不可救不可緩也

治小兒急慢驚風四肢逆冷脈張口噤涎不止保命丹

虎睛

一个猪尾上安之以
食鹽水浸火氣乾

箭頭朱砂

半兩

蜈蚣

二條去頭
尾赤海者

麝香

全蝎

半錢

天麻

一分

右爲細末煉蜜爲圓如此○大互麝肝之又入腦麝
膏定急驚風薄荷蜜湯化下慢驚風薄荷湯化下各
三圓更量兒大小加減與之些少驚悸亦可服之

又方

赤脚蜈蚣

一條去頭尾

蝎稍

草烏尖

七個半夏三個

右焙乾爲末入麝香三拾文輕粉半錢七用生薑自
然汁圓如此○大每服三圓金銀薄荷湯化下次用
生朱砂調塗病兒脚中心妙

治小兒毒氣攻腮腫赤可畏者

皂角

二兩去根

天南星

二錢生用

糯米

一合爲末

右為細末姜調塗立效

治小兒驚風

茯苓

甘州

朱砂

青黛

膩粉

右各等分入麝香少許每服一錢蜜水調下

治小兒驚熱

蝎

七個

天南星

取心為末一錢

人參

蛇退

各三錢重

右為末薄荷蜜湯調下

治小兒風毒

白牽牛

一兩半炒

大黃

三錢

青皮

甘州

朴硝

各一錢重

右為末每服一錢砂糖水調下

治小兒遍身浮腫方

黑牽牛

炒三兩

青木香

青皮

防風

檳榔

各一兩

右爲末麪糊爲圓如芥菜子大每服二十圓桑白皮

湯下

消毒順氣飲

人參

茯苓

甘草

升麻

各等分

右爲細末每服半錢生姜一片棗子半盞煎至一大

呷許溫服不計時候

治小兒吐瀉不止

龍骨

火燒留性

滑石

定粉

各等分

右爲末每服一錢至二錢熟水調下

治小兒痢疾

天南星

右一味炮烈出火毒去黑皮不拘多少爲末每服半錢生薑薄荷蜜酒調下

治小兒疳積黃瘦吐食

川烏錢一 定粉錢三

芥灰錢二

龍骨同上

右爲末滴水爲圓龍眼核大作餅子每服一餅飯飲磨下

治小兒疳積秘方蘆薈圓

蘆薈

荊芥

黑牽牛

青皮

各等分
事治

右精細事治炮製為末麪糊為圓如大粟米大兒一歲以下一圓或二圓亦不妨自加減與之

治小兒顛癇欲發眼暗痰涎聲惡嚼舌雌黃圓

雌黃

黃丹

各一兩
少炒

麝香

一錢
研

右為末拌令極勻用牛乳汁半升熬成膏入前件藥末拌三五百下圓如菉豆大每服三圓溫熬水下
日三服此方得自干明醫之家後余嘗傳與一貧因
是藥醫道大行

治小兒驚風積熱

全蝎

七十个 去毒

蟬退

二十一个

甘艸

天南星

大者一枚 炮令毒

右為末每服半錢水半盞薄荷七小葉煎至七分溫服

治小兒驚發

寒水石

二兩

甘艸

丁

馬牙消

四兩 重

朱砂

丁分

右件為末令極細次入腦麝各三十文煉蜜搜和圓

如龍眼核大用瓷罇盛之每服一圓或半圓量兒大

小兒弱與之薄荷湯候冷調下

治小兒哮喘

黃丹

砒霜

右各生用為末用棗肉為圓如麻子大每服三圓臨

睡冷茶清下

治小兒赤熱腫脹

川大黃

白礬

右二味等分爲末用冷水調作奄子貼臍上立效

○治諸雜病等方

治骨鯁

白茯苓

右一味臨時細切研爲末以所鯁骨煎湯調下

治果報面生瘡瘤方

右用艾圓灸十粒即用醋磨雄黃塗帑上剪如螺螄

奄于大貼所灸處更用膏藥重貼二日一換候痒癢
出膿如菜豆粉即愈

治盜汗

藏靈仙

甘艸各半兩

右爲末每服三錢溫酒調下

治盜汗外腎濕

人參

錢一

苦參

三錢重

龍牙草

同上

麻黃根

同上

右件爲末煉蜜圓如此○大每服三十圓煉麩湯下

治脚汗

白礬

乾葛等分

右二味爲末每服半兩水三椀煎十數沸熱洗逐日
一次經三五日自然無

治疥不以新久方

白蕪荑 下 檳榔 吳茱萸 各半兩 硫黃 二錢重

右爲末麻油調抓破指戴袁州公使庫本

宣積手心握藥便通

巴豆 乾薑 韭子 良姜

硫黃 甘遂 白檳榔 各等分

右爲末研飯爲圓如〇大用時早朝使椒湯洗手了

麻油塗手掌口握藥一粒移時便瀉止即以冷水洗手

宣積藥

巴豆

一百粒去殼水洗四十九次

五靈脂

白薑

赤茯苓

右爲末用醋糊圓如菉豆大每服五圓冷茶清五更初服或欲瀉止冷水洗手面脚三處立佳

類證普濟本事方卷之十 大尾

凡天地之間粗者易求精者難得猶金玉之寡瓦石之多從昔醫家蓄方之書雖多其精者鮮矣惟本事方尤精者也因之變通何有不愈之病然其書以字誤句差本朝曾未刊行今也幸得全本苟以蒼生不悅乎予則訓點焉令梓鏤之洽于天下云

享保乙卯四月甲戌泝流書于中正堂

享保廿^乙卯立夏良辰發行

享保廿一年辰四月板行出來

大坂新町西口小濱町

書林

向井八三郎刊行